

Avoxa



Avoxa

Informacija atnaujinta:

26.11.2019

Herbicidai

Registracijos Nr.:

AS2-52H (2017)

Pakuotė:

5 l

Veikli medžiaga:

33,3 g/l (3,2%)

pinoksadenas

8,33 g/l (0,8%)

piroksulamas

Cheminė grupė:

fenilpirazolinų

triazolpirimidino sulfonamidų

Produkto forma:

EC (koncentruota emulsija)

Veikimo būdas:

sisteminis atrankinis

Pinoksadenas patenka į piktžoles per lapus ir veikia kaip acetil-kofermento A karboksilazės blokatorius, stabdantis ląstelių dauginimąsi. Iš kitų acetil-kofermento A karboksilazės blokatorių – veikiančių tik chloroplastuose, pinoksadenas šį fermentą veikia ir citoplazmoje. Pinoksadenas augale pernešamas į meristeminius audinius, kurie iš karto po purškimo nustoja augę, o lapai po kurio laiko įgauna rausvą atspalvį. Po 20 dienų augalas pradeda irti, lapai lengvai išsitraukia iš lapamkščių, o stiebas lengvai trūksta ties bambliais. Piroksulamas – patekęs į augalus slopina fermentą acetolaktato sintazę, dėl to nesusidaro šakotos grandinės amino rūgštys ir augalai žūsta.

Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose.

Product CP: Tabs

- [Naudojimo rekomendacijos](#)
- [Saugus naudojimas](#)
- [Purškimas](#)
- [Pirmoji pagalba](#)

[Naudojimo rekomendacijos](#)

[Avoxa Kviečiai](#)

Kviečiai

Žieminių ir vasarinių kviečiai

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas:

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų.

Aklės (Galeopsis spp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės sklypą ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Baltoji balanda (Chenopodium album)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Daržinė žliūgė (Stellaria media)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Dirsės (Bromus spp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Dirvinė krapažolė (Euphorbia helioscopia)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė			

apribojimai:	nei 25 ^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Efektyvumas:	> 80-90%

Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Dirvinė smilguolė (*Apera spica - venti*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Kibisis lipikas (*Galium aparine*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Ramunės (Matricaria spp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Rapsų pabiros (*Brassica napus*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Raudonžiedis progailis (*Anagallis arvensis*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	60-80%			

Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė			

apribojimai:	nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Efektyvumas:	80-90%

Smalkinis tvertikas (*Erysimum cheiranthoides*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Svidrės (*Lolium spp.*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Tuščioji aviža (*Avena fatua*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Veronikos (*Veronica spp.*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Vijoklinis pelėvirkštis (*Fallopia convolvulus*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Avoxa Žieminiai kvietrugiai

Žieminiai kvietrugiai

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas:

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų.

Aklės (*Galeopsis spp.*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Baltoji balanda (*Chenopodium album*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Daržinė žliūgė (*Stellaria media*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Dirsės (*Bromus spp.*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į			

Efektyvumas: gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
80-90%

Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Dirvinė smilguolė (*Apera spica - venti*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į			

Efektyvumas: gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
> 90%

Kibusis lipikas (Galium aparine)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Naudojimo laikas: Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.
Naudojimo apribojimai: Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Efektyvumas: > 80-90%

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Naudojimo laikas: Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.
Naudojimo apribojimai: Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Efektyvumas: > 90%

Ramunės (Matricaria spp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
------------------------	--	--------------------------------	------------------------------	---

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Naudojimo laikas: Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.
Naudojimo apribojimai: Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Efektyvumas: > 80-90%

Rapsų pabiros (Brassica napus)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Naudojimo laikas: Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.
Naudojimo apribojimai: Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Efektyvumas: > 90%

Raudonžiedis progailis (Anagallis arvensis)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Naudojimo laikas: Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.
Naudojimo apribojimai: Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į

Efektyvumas: gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
60-80%

Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Smalkinis tvertikas (*Erysimum cheiranthoides*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Svidrės (*Lolium spp.*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-74	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Tuščioji aviža (Avena fatua)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų			

išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Efektyvumas: > 90%

Veronikos (Veronica spp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Avoxa Žieminiai rugiai

Žieminiai rugiai

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas:

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų.

Aklės (Galeopsis spp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Baltoji balanda (Chenopodium album)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Daržinė žliūgė (Stellaria media)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			

Efektyvumas: > 80-90%

Diršės (Bromus spp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Dirvinė krapažolė (Euphorbia helioscopia)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Efektyvumas:	> 80-90%

Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Dirvinė smilguolė (*Apera spica - venti*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

garstukai

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Kibasis lipikas (Galium aparine)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Ramunės (Matricaria spp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Rapsų pabiros (Brassica napus)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Raudonžiedis progailis (Anagallis arvensis)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			

apribojimai:	nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Efektyvumas:	60-80%

Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Smalkinis tvertikas (*Erysimum cheiranthoides*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,80 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo laikas:	Nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio.			
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Svidrės (*Lolium spp.*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 80-90%			

Tuščioji aviža (Avena fatua)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,35-1,8 l/ha	1	BBCH 22-32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Veronikos (Veronica spp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	80-90%			

Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
1,8 l/ha	1	BBCH 22–32	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.			
Efektyvumas:	> 90%			

Saugus naudojimas

ATSARGIAI. Kenksminga įkvėpus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Dėmesio

Higienos priemonės

- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų

Saugos priemonės

- Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²). Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).
- Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²).
- Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
- Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai privaloma laikytis ne mažesnių kaip 2 metrų apsaugos zonų iki kelių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės sklypą ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

Purškimas

Maišymas su kitais produktais

Avoxa mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

Tirpalo ruošimas

Prieš pradėdant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvai, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirtą švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Avoxa kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Purškimo technika

Purškti įprastiniais traktoriniais lauko purkštuvais. Prieš pradėdant dirbti tinkamai sureguliuoti purkštuvą. Purškimo metu palaikyti rekomenduojamą 2-3 barų slėgį purškimo sistemoje. Saugoti, kad produktas nepatektų ant greta augančių augalų.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu + 35°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

Pirmoji pagalba

- Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

