

## Axial 50EC Žieminiai kvietrugiai

Žieminiai kvietrugiai

### Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas:

Siekiant išvengti atsparumo peliniui pašiaušėliui (*Alopecurus myosuroides*), tuščiajai avižai (*Avena fatua*) atsiradimo javuose, herbicidą naudokite tik esant jaunoms ir intensyviai augančioms piktžolėms.

### Dirvinė smilguolė (*Apera spica - venti*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)
0,6 arba 0,9 l/ha	1	BBCH 25-37
<b>Naudojimo laikas:</b>	0,6 l/ha - krūmijimosi pabaiga - stiebo augimo metu (BBCH 25-32). 0,9 l/ha - paskutinio lapo pasirodymo metu (BBCH 37).	
<b>Naudojimo apribojimai:</b>	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 <sup>o</sup> C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.	

### Pelinis pašiaušėlis (*Alopecurus myosuroides*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)
0,9 arba 1,2 l/ha	1	BBCH 25-37
<b>Naudojimo laikas:</b>	0,9 l/ha - krūmijimosi pabaiga-stiebo augimo metu (BBCH 25- 32). 1,2 l/ha - Paskutinio lapo pasirodymo metu (BBCH 37).	
<b>Naudojimo apribojimai:</b>	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 <sup>o</sup> C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.	