

Axial 50EC Vasariniai miežiai

Vasariniai miežiai

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas:

Siekiant išvengti atsparumo peliniui pašiaušėliui (*Alopecurus myosuroides*), tuščiajai avižai (*Avena fatua*) atsiradimo javuose, herbicidą naudokite tik esant jaunoms ir intensyviai augančioms piktžolėms.

Tuščioji aviža (*Avena fatua*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)
0,6 arba 0,9 l/ha	1	BBCH 25-37
Naudojimo laikas:	0,6 l/ha - krūmijimosi pabaiga–stiebo augimo metu (BBCH 25- 32). 0,9 l/ha - Paskutinio lapo pasirodymo metu (BBCH 37).	
Naudojimo apribojimai:	Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės sklypą ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.	