

LIETUVA

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.lt>)

[Pagrindinis](#) > Teridox 500 EC

Teridox 500 EC



Teridox 500 EC

Informacija atnaujinta:

26.11.2019

Herbicidai

Registracijos Nr.:

AS2-21H/2014

Pakuotė:

20 l

Veikli medžiaga:

500 g/l (47,5 %)

dimetachloras

Cheminė grupė:

chloracetanilidinių junginių

Produkto forma:

EC (koncentruota emulsija)

Veikimo būdas:

sisteminis atrankinis

Dimetachloras – veiklioji medžiaga, į dygstančias piktžoles daugiausiai patenka per daigus, patekusi į augalą slopina ląstelių dauginimosi procesą, piktžolės nustoja augti ir žūsta. Herbicidas gerai veikia, kai dirva yra drėgna, nes sudaro storesnį apsauginį sluoksnį. Teridox 500 EC nelakus, todėl išpurškus įterpti nereikia.

Sisteminio veikimo, naudojamas vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.

Product CP: Tabs

- [Naudojimo rekomendacijos](#)

- [Saugus naudojimas](#)
- [Purškimas](#)
- [Pirmoji pagalba](#)
- [VEIKSMINGUMAS](#)

Naudojimo rekomendacijos

Teridox 500 EC žieminiai ir vasariniai rapsai

žieminiai ir vasariniai rapsai

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas:

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

Aguonos (Papaver sp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m

Naudojimo laikas: Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14).

Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).

Naudojimo apribojimai: Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purškšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.

Efektyvumas: 50-80%

Baltoji balanda (Chenopodium album)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminčius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius. vVdutiniškai jautrios purškiant pavasarį.			
Efektyvumas:	> 80%			

Bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum perforatum*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminčius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			
Efektyvumas:	> 80%			

Daržinė žliūgė (*Stellaria media*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius. vDutiniškai jautrios purškiant po žieminių rapsų sudygimo.			
Efektyvumas:	> 80%			

Dirvinis garstukas (*Sinapis arvensis*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles,			

Efektyvumas: pupas ir cukrinius runkelius.
50-80%

Dirvinė karpažolė (*Euphorbia helioscopia*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			
Efektyvumas:	50-80%			

Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo,			

galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.

Efektyvumas: > 80%

Dirvinė smilguolė (*Apera spica - venti*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:		Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).		
Naudojimo apribojimai:		Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.		
Efektyvumas:		> 80%		

Dirvinė čiužutė (*Thlaspi arvense*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:		Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).		
Naudojimo		Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai,		

apribojimai:	<p>tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.</p>
Efektyvumas:	50-80%

Javų pabiros

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			
Efektyvumas:	50-80%			

Kibusis lipikas (Galium aparine)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14).			

Naudojimo apribojimai:	Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09). Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.
Efektyvumas:	50-80%

Našlaitės (Viola sp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			
Efektyvumas:	50-80%			

Notrelės (Lamium sp.)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
-----------------	-------------------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------------------

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminčius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			
Efektyvumas:	> 80%			

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminčius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			
Efektyvumas:	50-80%			

Rugiagėlės (*Centaurea cyanus*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			
Efektyvumas:	> 80%			

Snapučiai (*Geranium sp.*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			

Efektyvumas: > 80%

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminis javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius. Vidutiniškai jautrios purškiant po žieminių rapsų sudygimo.			
Efektyvumas:	> 80%			

Vaistinė pikulė (Sisymbrium officinale)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminis javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo,			

galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.

Efektyvumas: 50-80%

Vaistinė ramunė (*Matricaria recutita*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			
Efektyvumas:	> 80%			

Veronikos (*Veronica spp.*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai,			

apribojimai:	<p>tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.</p>
Efektyvumas:	> 80%

Vienmetė miglė (*Poa annua*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09).			
Naudojimo apribojimai:	Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius.			
Efektyvumas:	> 80%			

Vijoklinis pelėvirkštis (*Fallopia convolvulus*)

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	Šalimais augančių augalų apsaugos zona
2,0 l/ha	1	Žieminiai rapsai BBCH 00-14 / vasariniai rapsai BBCH 00-09	10 metrų apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.	5 m
Naudojimo laikas:	Žieminiai rapsai - po sėjos, iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00-14).			

Naudojimo apribojimai:	Vasariniai rapsai - po sėjos, iki sudygimo (BBCH 00-09). Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Teridox 500 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, pašarines žoles, pupas ir cukrinius runkelius. vVdutiniškai jautrios purškiant pavasarį.
Efektyvumas:	> 80%

Saugus naudojimas

Dėmesio	<p>ATSARGIAI. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra dimetachloro dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.</p>
Higienos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Saugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Asmeninės apsaugos priemonės gali būti pakeistos inžinerinėmis kontrolės priemonėmis, jeigu jos suteikia lygiavertę ar didesnę apsaugą. • Darbuotojams eiti į herbicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.
Naudojimo apribojimai	Herbicidas gerai veikia, kai dirva yra drėgna, nes sudaro storesnę apsauginę sluoksnį. Teridox 500 EC nelakus, todėl išpurškus įterpti nereikia.

Purškimas

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę purkštuvu rezervuaro švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą produkto kiekį ir supilkite likusį vandens kiekį, tirpalą išpurškite tą pačią dieną. Purškite su nuolat įjungtu maišytuvu, kad išlaikytų vienalytę tirpalo suspensiją. Pakuotės dugne gali būti kristalų. Tokiu atveju indą reikia patalpinti į šiltą vandenį ir maišyti tol, kol ištirps kristalai ir tik po to ruošti tirpalą.

Purškimo technika

Naudokite gerai sureguliuotus purkštuvus. Purkštuvai turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje.

Vandens kiekis

200 - 300 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo šalčio. Laikyti ne žemesnėje negu +10°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Galiojimo laikas 2 metai.

Pirmoji pagalba

- **Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Informacija gydytojui

Nėra jokių specialių priešnuodžių. Gydomas simptominis.

Neskatinti vėmimo - sudėtyje yra naftos distiliatų ir/arba aromatinių tirpiklių.

VEIKSMINGUMAS

Piktžolės	Lotyniškas piktžolės pavadinimas	Brasan 540 EC 2,0 l/ha	Teridox 500 EC 2,0 l/ha	Brasan 540 EC + Teridox 500 EC 1,0 + 1,0 l/ha
Rūgtis takažolė	<i>Polygonum aviculare</i>	● ● ●	○	● ● (●)
Plačioji balandūnė	<i>Atriplex patula</i>	● ●	● ●	● ●
Trikertė žvaginė	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Démėtasis rūgtis	<i>Polygonum persicaria</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Paprastoji gaiva	<i>Lapsana communis</i>	● ● ●	○	● ● (●)
Dirvinis kežys	<i>Spergula arvensis</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Dirvinė krapažolė	<i>Euphorbia helioscopia</i>	● ● ●	● ●	● ● (●)
Vaistinė žvirbliarūtė	<i>Fumaria officinalis</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Paprastoji žilė	<i>Senecio vulgaris</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Vaistinė pikulė	<i>Sisymbrium officinale</i>	● ● ●	● ●	● ● ●
Vikiai	<i>Vicia sp.</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Notrelės	<i>Lamium sp.</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Trumpamakštis rūgtis	<i>Persicaria lapathifolia</i>	● ●	○	● ●
Neužmirštuolės	<i>Viola sp.</i>	● ●	● ●	● ●
Gauruotoji kartenė	<i>Cardamine hirsuta</i>	● ● ●	○	● ●
Dirvinė aklė	<i>Galeopsis tetrahit</i>	● ●	● ●	● ●
Ramunės	<i>Matricaria sp.</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Nuodingoji šunpetrė	<i>Aethusa cynapium</i>	● ● ●	○	● ● (●)
Šerytė	<i>Setaria sp.</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Pienės	<i>Sonchus sp.</i>	● (●)	● (●)	● (●)
Vijoklinis pelėvirkštis	<i>Fallopia convolvulus</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Dirvinis vėdrynas	<i>Ranunculus arvensis</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Šlaitinė rasakila	<i>Alchemilla vulgaris</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Aguona birulė	<i>Papaver rhoeas</i>	● ● ●	● ●	● ● ●
Snaputis	<i>Geranium sp.</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Veronikos	<i>Veronica sp.</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Vienmetė miglė	<i>Poa annua</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Juodoji kiauliuogė	<i>Salanum nigrum</i>	● ● ●	○	● ● (●)
Smulkiažiedė galinsoga	<i>Galinsoga parviflora</i>	● ● ●	○	● ● (●)
Gausiasėklė balanda	<i>Chenopodium polyspermum</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Dirvinė čižutė	<i>Thlaspi arvense</i>	● ● ●	● ●	● ● (●)
Dirvinė neužmirštuolė	<i>Myosotis arvensis</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Pelinis pašiaušėlis	<i>Alopecurus myosuroides</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Raudonžiedis progailis	<i>Anagallis arvensis</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Dirvinis ridikas	<i>Raphanus raphanistrum</i>	● ●	● ●	● ●
Dirvinis garstukas	<i>Sinapis arvensis</i>	● ●	● ●	● ●
Svidrės	<i>Lolium sp.</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Gailioji dilgėlė	<i>Urtica urens</i>	● ● ●	○	● ● (●)
Paprastasis poklius	<i>Descurainia sophia</i>	● ● ●	● ●	● ● (●)
Kibusis lipikas	<i>Galium aparine</i>	● ● ●	● ●	● ● (●)
Rugiagėlė	<i>Centaurea cyanus</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Smilguolė	<i>Apera spica-venti</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Rauktalapė rūgštyinė	<i>Rumex sp.</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Paprastoji rietmenė	<i>Echinochloa crus-galli</i>	● ● ●	● ●	● ● (●)
Šiurkštusis burnotis	<i>Amaranthus retroflexus</i>	● ● ●	○	● ●
Baltoji balanda	<i>Chenopodium album</i>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Baltasis šakinys	<i>Silene latifolia</i>	● ● ●	○	● ●

Raudonžiedė notrelė

Lamium purpureum



Daržinė žliūgė

Stellaria media



○ mažas poveikis, jokie poveikio arba nežinomas poveikis

● ● nuo vidutinio iki gero efekto

● ● ● nuo gero iki labai gero efekto
