

Augimo reguliatorių panaudojimas rapsuose pavasari

Produktai:

Toprex 375 SC

Naujienos

11.04.2019

Augimo reguliatoriai ir augalų augimą reguliuojančiomis savybėmis pasižymintys fungicidai turi vieną svarbią rapsų augalų augimo reguliavimo savybę - slopina pagrindinio stiebo augimą į viršų, bet skatina šakų formavimąsi ant stiebo kuo arčiau dirvos paviršiaus ir kartu skatina iš šakų formotis pridėtines šakas.


Syngenta augimo reguliatorius -fungicidas Toprex, dviejų veiklių medžiagų produktas, naudojamas tiek kaip fungicidas apsaugoti nuo fomezės, tiek kaip augimo reguliatorius.

Toprex panaudojimas pavasarį stimuliuoja aktyvų smulkių šaknelių augimą, kas padidina augalo šaknų masę net iki 20% , o tai garantuoja geresnį vandens bei maisto medžiagų įsisavinimą, padidėja augalų atsparumas sausroms.


Pavasarinis augimo reguliatoriaus naudojimas taip pat trumpina pagrindinį stiebą bei skatina šoninių šakų augimą. Papildomos, stiprios šoninės šakos - didesnis derlius. Geriau išnaudojama saulės šviesa ir padidinamas augalų potencialas.

Ilgalaikis ir veiksmingas augalų sutrumpinimas buvo įrodytas 86 bandymuose Vokietijoje.

Syngenta bandymai Vokietijoje purkšta pavasarį BBCH 35-55



Toprex įtaka augalo aukščiui labai priklauso nuo produkto panaudojimo laiko



Rapsų fomozė - kitaip vadinamas stiebo sausasis puvinys, vėžys - tai rapsų liga, kuri pažeidžia rapsų daigus, suaugusių augalų lapus, stiebus, ypač apatinę jų dalį ir ankštaras. Ant pažeistų augalo dalių atsiranda pilkos įdubusios dėmės su tamsiais pakraščiais. Tiek ant lapų, tiek ant stiebų dėmėse susidaro juodi, smulkūs taškeliai. Stiebo audiniai lupasi, nustoja vystytis ir stiebai lūžta. Jeigu fomozė pasireiškia ankstyvais tarpsniais, liga gali padaryti daug žalos, nes pažeisti augalai šaknies kaklelio srityje, nutrūkus medžiagų apykaitai, bręsta anksčiau laiko. Jei liga pasireiškia vėlyvais tarpsniais, stiebo apatinėje dalyje susidaro tik rudos fomezės dėmės, augalai išlieka žali virš pažeistų vietų ir tokiu atveju žala nėra didelė. Derliaus nuostoliai priklauso nuo fomezės intensyvumo, stipriai pažeisti augalai bręsta anksčiau nei sveikieji, sėklos užauga smulkios, be to, anksti subrendusių augalų ankštaros atsidaro ir sėklos išbyra dar prieš derliaus nuėmimą.

Toprex veiksmingumas nuo grybinių ligų

<i>Fomozė</i>	labai geras
<i>Alternariozė*</i>	labai geras
<i>Pilkasis puvinys*</i>	geras
*Vokietijos patirtis	



Rapsų fomezė



Rapsų fomezė



PAVASARĮ

Apsauga nuo vėlyvos fomezės

Stiprūs, žemesni, šakoti augalai

Tolygesnis augalų žydėjimas,
vienoda ankštarių branda,
gausesnis derlius

Video of Toprex naudojimo laikas