

VIXERAN
AZOTO FIKSAVIMO IR AUGALŲ AUGIMO SKATINIMO PREPARATAS, PAGAMINTAS
MIKROORGANIZMŲ PAGRINDU

Funkcinė kategorija: AUGALŲ BIOSTIMULIATORIUS
Identifikavimo Nr.: C.1.1.1.1.1 Bakterijų biomasės produktas

VIXERAN yra biologinės kilmės trąša, kurios pagrindą sudaro endofitinio mikroorganizmo *Azotobacter salinestris* CECT 9690 padermė, ypač veiksmingai fiksuojanti azotą (N) augalų lapuose ir šaknyse. Produktas pasižymi gebėjimu fiksuoti atmosferos azotą net esant deguoniui. VIXERAN gali užtikrinti augimą, derlių ir derliaus kokybę net ir stresinėmis sąlygomis.

VANDENYJE ŠLAMPANTYS IR TIRPSTANTYS MILTELIAI SKIRTI PROFESONALIAM
NAUDOJIMUI. PRIEŠ NAUDOJANT ŠĮ PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ
ETIKETĘ

SUDĖTIS:

Azotobacter salinestris CECT 9690 padermė 1×10^7 kvs/g

PRIEMAIŠOS:

<i>Escherichia coli</i>	Neaptikta/1 g
<i>Listeria monocytogenes</i>	Neaptikta/25 g
<i>Salmonella</i> rūšys	Neaptikta/25 g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Neaptikta/25 g
<i>Vibrio</i> rūšys	Neaptikta/25 g
<i>Shigella</i> rūšys	Neaptikta/25 g
<i>Salmonella</i> rūšys	Neaptikta/25 g
<i>Enterococcaceae</i>	< 10 kvs/g
<i>Pelėsiai ir mielės</i>	<100 kvs/g
Šešiavalentis chromas (Cr(VI))	<0.5 mg/kg
Arsenas (As)	<2.0 mg/kg
Kadmis (Cd)	<0.5 mg/kg
Chromas (Cr)	<0.5 mg/kg
Varis (Cu)	<2.0 mg/kg
Gyvsidabris (Hg)	<0.2 mg/kg
Nikelis (Ni)	<0.5 mg/kg
Švinas (Pb)	<2.0 mg/kg
Cinkas (Zn)	<0.5 mg/kg
Selenas (Se)	<2.0 mg/kg

NAUDOJIMO BŪDAS

VIXERAN naudojamas žemės ūkio, sodo ir daržo, bei sumedėjusiems augalams.

Žemės ūkio /kultūriniai žoliniai augalai: naudoti purškiant ant lapų.

Sodo ir daržo augalai (daržovės), sumedėję augalai: naudoti per augalų trąšų laistymo (fertigacijos) arba kitas tręšimo sistemas, kurios lokalizuoja produktą šalia šaknų, arba purškiant ant lapų.

Naudojimas	Norma	Purškimo laikas
Žemės ūkio augalai	1x 25-50 g/ha	Nuo prieš sėjos iki vegetacijos pabaigos
Daržovės (šiltnamyje ir/arba lauke)	25-75 g/ha vieno tręšimo metu arba iki 4 tręsimų augalų vegetacijos metu, neviršijant 200 g/ha bendro kiekio, priklausomai nuo augalo vystymosi ciklo trukmės	Nuo prieš sėjos iki vaisių brandimo pradžios arba likus vienam mėnesiui iki derliaus nuėmimo, jei derlius imamas atrankiniu būdu.
Vaisiniai augalai	2 – 3 tręšimai x 50 g/ha	Nuo vegetacijos pradžios iki vaisių brandimo pradžios arba likus vienam mėnesiui iki derliaus nuėmimo, jei derlius imamas atrankiniu būdu.
Sumedėję daugiamečiai augalai - vaismedžiai, uogakrūmiai	2 – 3 tręšimai x 50 g/ha	Nuo vegetacijos pradžios iki vaisių brandimo pradžios arba likus vienam mėnesiui iki derliaus nuėmimo, jei derlius imamas atrankiniu būdu.

VIXERAN galima naudoti su dauguma trąšų ir augalų apsaugos produktais. Dėl išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į gamintoją arba platintoją.

Pridėjus probiotikų, tokių kaip produktai, kurių pagrindą sudaro aminorūgštys arba jūros dumbliai, galima paskatinti mikroorganizmų augimą ir VIXERAN efektyvumą.

SAUGOS PRIEMONĖS

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P260 Neįkvėpti dulkių

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti

Nepraryti.

Patekus į akis ir (arba) ant gleivinės, pažeistą vietą nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Sudėtyje yra mikroorganizmų. Gali sukelti jautrinimo reakcijas.

Dirbant su produktu ar liečiant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones: vienkartinę respiratorių arba kaukę su filtrais(atitinkančias standartą EN 149FFP3).

Dėmesio!

Neišmesti talpyklos į aplinką. Vengti produkto sąlyčio su oda ir akimis. Neviršyti rekomenduojamos produkto normos. Naudojant produktą, laikytis atitinkamų saugumo priemonių užtikrinančių jog nebus padaryta žala sveikatai. Naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones ir nusiplauti rankas po produkto naudojimo.

Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių.

Pakuotės negalima naudoti pakartotinai.

PRODUKTO LAIKYMAS

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ar kitų šilumos šaltinių. Nelaikyti žemesnėje kaip 5 °C ir aukštesnėje kaip 35 °C temperatūroje. Produktas nėra degus(ar lengvai užsidegantis). Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 24 mėnesius.

Gamintojas atsako už produkto sudėtį, formuliaciją ir turinį. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti (dėl etiketėje pateiktų rekomendacijų nesilaikymo).

Kilmė šalis: Ispanija

Partija ir pagaminimo data: Žiūrėti ant pakuotės

Grynas svoris: 50 g – 250 g

Partijos numeris: XXX

Leidimo turėtojas:

Syngenta Polska Sp. z o.o.,

Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
Polska

Kontaktinė informacija Lietuvoje:

Gynėjų g. 16, Vilnius,: tel. +370 52420017.

Gamintojas:

CERES BIOTICS TECH, S.L.

Mar Tirreno 8, Naves C27-C29, 28830 San
Fernando de Henares, Madrid, Ispanija

www.ceresbiotics.com

tel: +34 919 20 35 49

Platintojas:

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ul.Szamocka 8, 01-748 Varšuva, Lenkija.

Kontaktinė informacija Lietuvoje:

Gynėjų g. 16, Vilnius,: tel. +370 52420017.